


Accenteur mouchet (*Prunella modularis*)

Où l'Accenteur mouchet passe-t-il le plus clair de son temps ?

- A. Dans les arbres
- B. Au sol
- C. Dans les airs





(photo prise sur les bords de Seine)

Réponse B : L'accenteur mouchet se nourrit essentiellement d'insectes et de vers qu'il trouve en fouillant l'humus. C'est pourquoi on l'observe souvent sautillant sur le sol, à l'abri des buissons. Son nid aussi n'est jamais loin du sol mais toujours bien camouflé dans les broussailles. D'un naturel très discret, l'Accenteur mouchet se perche cependant au sommet d'un arbre lorsqu'il chante. A Orly, il est présent dans tous les espaces verts où l'on trouve des buissons denses.

Hypolaïs polyglotte (*Hippolaïs polyglotta*)

Pourquoi l'hypolaïs est-elle polyglotte ?

- A. Elle sait parler plusieurs langues
- B. C'est le seul oiseau à avoir deux glottes
- C. Elle imite très bien le chant des autres oiseaux






(photo prise au Trou d'Enfer)

Réponse C : Ce petit passereau de la famille des fauvettes est plus facile à entendre qu'à voir. En effet, il passe le plus clair de son temps dans les taillis à la recherche d'insectes. Cependant, il se montre volontiers pour chanter au sommet d'un buisson. Il vit dans des milieux transitoires, comme les friches reconquises par la végétation. À Orly, on peut l'observer au Trou d'Enfer.

Merle noir (*Turdus merula*)

Qui sont les merles noirs leuciques ?

- **A.** Ce sont les merles noirs juvéniles
- **B.** Ce sont des merles partiellement blancs
- **C.** Ce sont des merles entièrement blancs avec les yeux rouges





(photo prise au Parc des Saules)

Réponse B : Le merle est un oiseau commun aussi bien en milieu urbain que rural. Il n'est pas rare d'entendre son joli chant ou de l'apercevoir sautillant dans l'herbe. Le mâle est noir avec un bec jaune vif tandis que la femelle est brune avec un bec terne. Certains individus peuvent cependant présenter des anomalies pigmentaires. Les merles leuciques sont ainsi partiellement blancs tandis que les merles albinos sont entièrement blancs et ont les yeux rouges.

Mésange à longue queue (*Aegithalos caudatus*)

Combien mesure la queue de la mésange à longue queue ?

- A. Elle est plus longue que le reste du corps
- B. Elle est aussi longue que le reste du corps
- C. Elle est un peu plus petite que le reste du corps





(Photo prise sur la Darse)

Réponse A : La mésange à longue queue porte bien son nom puisqu'elle mesure environ 14 cm dont 9 cm pour la queue. Assez commune dans les espaces verts d'Orly, elle constitue souvent des groupes de plusieurs dizaines d'individus. Contrairement aux autres espèces de mésange qui sont cavernicoles, la mésange à longue queue est arboricole, c'est-à-dire qu'elle ne construit pas son nid dans une cavité mais dans un arbre.



Rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros*)

Pourquoi le rougequeue noir est aussi appelé "rossignol des murailles" ?

- A. Car il apprécie beaucoup les pans rocheux
- B. Car il protège ses œufs derrière une muraille de brindilles
- C. Car il a été identifié pour la première fois sur la muraille de Chine en 1453





(Photo prise à proximité des LOPOFA)

[REDACTED]

Réponse A : Le rougequeue noir vit en milieu rupestre, qu'il soit naturel ou artificiel. Les parois rocheuses lui fournissent un abri pour son nid ainsi qu'un terrain de chasse. En ville, on peut le voir perché bien en évidence sur un muret, un buisson ou les branches basses d'un arbre d'où il surveille le sol à la recherche de petits insectes. Lorsque la végétation est plus dense, le rougequeue noir laisse la place à son cousin, le rougequeue à front blanc.

[REDACTED]

Pour vous récompenser de votre participation au quiz, un souvenir de l'exposition vous attend à la Maison des projets et du développement durable (à venir récupérer du mardi au vendredi entre 14h30 et 17h30).